

LE BARYCENTRE RÉSUMÉ

A. BARYCENTRE DE DEUX POINTS

1. Définition : Soient a et b deux réels tels que $a + b \neq 0$ et deux points A et B du plan. Il existe un unique point G de la droite (AB) tel que $a \overrightarrow{GA} + b \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. G est appelé le barycentre du système de points pondérés $\{(A, a); (B, b)\}$.

Notation : $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b)\}$.

2. Caractérisation : Avec la condition $a + b \neq 0$, on a l'équivalence :

- 1) $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b)\}$;
- 2) Pour tout point M du plan, $a \overrightarrow{MA} + b \overrightarrow{MB} = (a + b) \overrightarrow{MG}$;
- 3) $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}$;
- 4) Il existe un point O tel que $\frac{a}{a+b} \overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b} \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OG}$.

3. Construction : exemples : $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3)\}$;



$K = \text{bar}\{(A, 2); (B, -1)\}$:

propriété : si $ab > 0$, alors $G \in [AB]$ et si $ab < 0$, alors $G \notin [AB]$.

4. Propriétés : a) Si $a = b$, G est appelé l'**isobarycentre** des points A et B ;

b) Pour k réel non nul, on a $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b)\} = G = \text{bar}\{(A, ka); (B, kb)\}$.

B. BARYCENTRE DE TROIS POINTS

1. Définition : Soient a , b et c trois réels tels que $a + b + c \neq 0$ et trois points A , B et C du plan. Il existe un unique point G du plan (ABC) tel que $a \overrightarrow{GA} + b \overrightarrow{GB} + c \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. G est appelé le barycentre du système de points pondérés $\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$.

Notation : $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$.


2. Caractérisation : Avec la condition $a + b + c \neq 0$, on a l'équivalence :

- 1) $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$;
- 2) Pour tout point M du plan, $a \overrightarrow{MA} + b \overrightarrow{MB} + c \overrightarrow{MC} = (a + b + c) \overrightarrow{MG}$;
- 3) $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b+c} \overrightarrow{AB} + \frac{c}{a+b+c} \overrightarrow{AC}$;
- 4) Il existe un point O tel que $\frac{a}{a+b+c} \overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b+c} \overrightarrow{OB} + \frac{c}{a+b+c} \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OG}$.

3. Construction : exemples : Sur la figure ci-contre,

$G_1 = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, 1)\}$; $G_2 = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3); (C, 1)\}$;

$G_3 = \text{bar}\{(A, 2); (B, -1); (C, 3)\}$.



4. Propriétés :

a) Si $a = b = c$, G est appelé l'**isobarycentre** des points A , B et C ou centre de gravité du triangle ABC ;

b) Pour k réel non nul, on a $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\} = \text{bar}\{(A, ka); (B, kb); (C, kc)\}$.

c) **Associativité** : si $a + b \neq 0$, soit S le barycentre de $\{(A, a); (B, b)\}$; alors $G = \text{bar}\{(S, a+b); (C, c)\}$.

d) Dans l'espace, le barycentre de trois points A , B et C est dans le plan (ABC) .

e) Coordonnées de G dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a+b+c}, \quad y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a+b+c} \quad \text{et} \quad z_G = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a+b+c}.$$

5. Généralisation :

Pour n entier supérieur à 3, le barycentre de n points pondérés $(A_1, a_1), (A_2, a_2), (A_3, a_3), \dots, (A_n, a_n)$ existe si la somme $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \neq 0$ et ce barycentre vérifie $a_1 \overrightarrow{GA}_1 + a_2 \overrightarrow{GA}_2 + a_3 \overrightarrow{GA}_3 + \dots + a_n \overrightarrow{GA}_n = \vec{0}$.

Exercices : a) Déterminer l'isobarycentre d'un quadrilatère quelconque $ABCD$.

b) Déterminer le barycentre du système $(A, 1), (B, 2), (C, -1), (D, 3)$.

c) Déterminer l'isobarycentre d'un tétraèdre $ABCD$.

d) $ABCDEFGH$ est un cube ; déterminer l'isobarycentre de la pyramide $ABCDE$; déterminer le barycentre de $(A, 1), (C, 2), (F, -1)$.